





# MRSA-Hygienemanagement

## Pflegestandard mobiler Patient/Bewohner

Das MRSA-Hygienemanagement empfiehlt sich gem. Robert Koch-Institut.

Wer	Wann	Womit	Bitte beachten	Was	Wie
Pflegepersonal Reinigungspersonal Bewohnerzimmers	Vor Betreten des Patienten-/Bewohnerzimmers	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	<b>Basishygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hygienische Händedesinfektion</li> <li>Mund-/Nasen-Schutz anlegen</li> <li>Schutzmittel anlegen: Foliodress / bei Gefahr der Durchmischung zusätzlich Einmalschutzschürze tragen: Vala Comfort aprons</li> <li>Einmalhandschuhe anziehen: Peha-soft nitrile white, Peha-soft nitrile fino</li> </ul>
Pflegepersonal	Nach Anordnung	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Abstriche</b>	Erforderliche Abstriche entnehmen (mind. Nasenvorhöfe, Rachenraum, ggf. Wunden)
Pflegepersonal	Nach Anordnung	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Wunde nach ärztlicher Anordnung abdecken Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Ggf. Verbandwechsel</b>	Bei stark sezernierenden Wunden vor der Ganzkörperwaschung
Pflegepersonal Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten		Auf ausweichend Einmalzahnbürsten achten.	<b>Mundpflege</b>	Zähneputzen mit Einmalzahnbürste
Pflegepersonal Patient/Bewohner	Nach Anordnung	Mundspülösung nach ärztlicher Angabe		<b>Antiseptische Mundspülung/Prothesenpflege</b>	Ärztliche Anordnung für Mundspülung beachten. Zahnprothese in Mundspülösung legen
Pflegepersonal Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten	Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)		<b>Zahnputz-/Prothesenbecher</b>	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmal Tuch gründlich auswaschen
Pflegepersonal	Täglich	<b>Für sensible Medizinprodukte und empfindliche Oberflächen:</b> Bacillol 30 foam (gebrauchsfertig), Bacillol 30 Tissues (gebrauchsfertige Tücher) <b>Für alkoholbeständige Flächen:</b> Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Pflegehilfsmittel und medizinische Geräte patienten-/bewohnerbezogen verwenden	<b>Desinfektion von persönlichen Gegenständen/Hilfsmitteln</b> <b>Desinfektion von Pflegehilfsmitteln/medizinischen Geräten</b>	<p><b>Wischdesinfektion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persönliche Gegenstände/Hilfsmittel: z.B. Sehlfäden, Hörgeräte, Schmuck, Rasierapparat (Empfehlung: Einmalrasierer verwenden), Fon</li> <li>Pflegehilfsmittel/medizinische Geräte: z.B. Blutdruckgerät, Fieberthermometer</li> </ul>
Pflegepersonal	Täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Stellisept med, Stellisept med foam, Stellisept med gloves	Krankenhaus-/Einrichtungswäsche im Waschesack entsorgen. Stellisept med Waschlotion auf den angelegten Waschlappen geben und sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 30 Sek. Einwirkzeit beachten. Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen und mit trockenem Handtuch abtrocknen. Stellisept med foam und Stellisept med gloves = "leave-on"-Produkt. Reinigungsschaum auf den Waschlappen geben oder mit den getränkten Handschuhen sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 60 Sek. Einwirkzeit beachten (Ein Abwaschen ist nicht erforderlich)	<b>Antimikrobielle Ganzkörperwaschung</b>	<p>Patienten/Bewohner entkleiden und Wäsche sofort in den Waschesack geben. Beim Waschen folgende Reihenfolge beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.Schritt:</b> Haare; Kopf auf frisches Handtuch legen; Stirn; Gesicht; Bei geschlossenen Augen von außen nach innen waschen; Ohren; Hals; Vorderseite und Seiten; Waschlappen entsorgen</li> <li><b>2.Schritt:</b> Oberkörper vorn; Obere Extremitäten; Axillen; Leisten; Oberschenkelaußenseiten; Untere Extremitäten Vorderseite; Genitalbereich; Waschlappen entsorgen; Waschwasser wechseln</li> <li><b>3.Schritt:</b> Patienten/Bewohner auf die Seite lagern; frischen Waschlappen benutzen; Hals; Nacken und Seiten; Rücken; Gesäß; Untere Extremitäten; Rückseite; Analbereich; Waschlappen entsorgen; Bewohner/Patienten abtrocknen; ggf. Einmalschutzschürze wechseln</li> </ol> <p>Solange der Patient/Bewohner auf der Seite liegt mit dem Wechsel der Bettwäsche beginnen Nach der Ganzkörperwaschung ggf. Verbandwechsel und Hautpflege durchführen und im Anschluss Patient/Bewohner mit frischer Wäsche bekleiden</p>
Pflegepersonal	Täglich	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med <b>Fläche:</b> Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen Der Bettwäschewechsel ist ggf. mit 2 Pflegepersonen durchzuführen, um eine Rekontamination der frischen Wäsche zu vermeiden. 30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	<b>Bettwäsche erneuern</b>	<p>Einmalhandschuhe sind vor dem Kontakt mit frischer Wäsche zu wechseln und eine hygienische Händedesinfektion muss erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopfkissen abzelen;</li> <li>Gebrauchtes Steck- und Bettlaken zur Mitte hin-aufrollen;</li> <li>Wischdesinfektion der freien Matratzenhülle;</li> <li>andere Seite legen;</li> <li>Frisches Laken der Länge nach bis zur Mitte aufrollen</li> <li>Gefaltene Matratze desinfizieren; MolliNea textile ausstreuen, bis zur Mitte aufrollen, in Gesäßhöhe legen und ggf. unter der Matratze einschlagen;</li> <li>Patienten/Bewohner über den Waschehugl auf die andere Seite legen;</li> <li>Gebrauchte Wäsche auf der anderen Seite abziehen und im Waschesack entsorgen;</li> <li>Restliche Matratze desinfizieren;</li> <li>Frisches Bettlaken/Stecklaken oder/und Krankennunterlage der Länge nach von der Bettmitte ausrollen, Laken straff ziehen und einspannen; Kopfkissen, Lagerungskissen und Bettdecke beziehen</li> </ul>
Pflegepersonal	Nach Anordnung	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Ggf. Verbandwechsel</b>	Bei trockenen, nicht infizierten Wunden nach der Ganzkörperwaschung
Pflegepersonal	Nach Pflegeplan	MenaIind-Körperpflege		<b>Ggf. Hautpflege</b>	
Pflegepersonal	3 x täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Mupirocin®, ggf. Alternative bei Resistenz <b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Applikation von Nasensalbe</b>	Streichholzgroße Menge mit einem Wattetupfer in beide Nasenvorhöfe. Nase zusammendrücken, anschließend zwischen Daumen und Zeigefinger massieren.
Pflegepersonal Reinigungspersonal	Täglich	<b>Fußboden:</b> (Konzentrat) Mikrobac forte, Kohlsolin FF <b>Kleine Flächen:</b> (gebrauchsfertige Tücher) Mikrobac Tissues, Kohlsolin FF Tissues	Mikrobac forte: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. Kohlsolin FF: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. (geringe Belastung) 7,5 ml/l 0,75% - 1 Std. (hohe Belastung)	<b>Desinfektion vom patienten-/bewohnernahen Umfeld und Fußboden</b>	<b>Wischdesinfektion</b> Möbiliar und Kontaktoberflächen: z.B. Tisch, Nachttisch, Bettgestell, Stuhlflächchen, Griffe, Handläufe, Türklinken, Lichtschalter, Telefon, Bettgäulen, Klingelanlagen
Pflegepersonal Reinigungspersonal	Vor Verlassen des Patienten-/Bewohnerzimmers	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	<b>Ausschleusen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einmalhandschuhe ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen</li> <li>Mund-/Nasen-Schutz im Zimmer im Müll entsorgen</li> <li>Einmalschutzmittel ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen</li> <li>Mehrweg-Schutzmittel im Zimmer belassen und bei Diensten im Waschesack entsorgen; Bei sichtbarer Verschmutzung sofort entsorgen</li> <li>Hygienische Händedesinfektion durchführen</li> </ul>



# MRSA-Hygienemanagement

## Pflegestandard mobiler Patient/Bewohner

Das MRSA-Hygienemanagement empfiehlt sich gem. Robert Koch-Institut.

Wer	Wann	Womit	Bitte beachten	Was	Wie
Pflegepersonal Reinigungspersonal Bewohnerzimmers	Vor Betreten des Patienten-/ Bewohnerzimmers	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	<b>Basishygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hygienische Händedesinfektion</li> <li>Mund-/Nasen-Schutz anlegen</li> <li>Schuttkittel anlegen: Foliodress / bei Gefahr der Durchmässung zusätzlich Einmalschutzschürze tragen: Vala Comfort aprons</li> <li>Einmalhandschuhe anziehen: Peha-soft nitrile white, Peha-soft nitrile fino</li> </ul>
Pflegepersonal	Nach Anordnung	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Abstriche</b>	Erforderliche Abstriche entnehmen (mind. Nasenvorhöfe, Rachraum, ggf. Wunden)
Pflegepersonal	Nach Anordnung	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Wunde nach ärztlicher Anordnung. Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Ggf. Verbandwechsel</b>	Bei stark sezernierenden Wunden vor der Ganzkörperwaschung
Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten		Auf ausreichend Einmalzahnbürsten achten	<b>Mundpflege</b>	Zähneputzen mit Einmalzahnbürste
Pflegepersonal Patient/Bewohner	Nach Anordnung	Mundspülösung nach ärztlicher Angabe		<b>Antiseptische Mundspülung/ Prothesenpflege</b>	Ärztliche Anordnung für Mundspülung beachten. Zahnprothese in Mundspülösung legen
Pflegepersonal Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten	Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)		<b>Zahnputz-/Prothesenbecher</b>	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmal Tuch nach Benutzung gründlich auswischen
Pflegepersonal	Täglich	<b>Für sensible Medizinprodukte und empfindliche Oberflächen:</b> Bacillol 30 foam (gebrauchsfertig), Bacillol 30 Tissues (gebrauchsfertige Tücher) <b>Für alkoholbeständige Flächen:</b> Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Pflegehilfsmittel und medizinische Geräte patienten-/bewohnerbezogen verwenden	<b>Desinfektion von persönlichen Gegenständen/Hilfsmitteln</b> <b>Desinfektion von Pflegehilfsmitteln/medizinischen Geräten</b>	<b>Wischdesinfektion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persönliche Gegenstände/Hilfsmittel: z.B. Sehhilfen, Hörgeräte, Schmock, Rasierapparat (Empfehlung: Einmalrasierer verwenden), Fön</li> <li>Pflegehilfsmittel/medizinische Geräte: z.B. Blutdruckgerät, Fieberthermometer</li> </ul>
Patient/Bewohner	Täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Stellsept med, Stellsept med foam, Stellsept med gloves	Krankenhaus-/Einrichtungswäsche im Wäschesack entsorgen Stellsept med Wäschelotion auf den angefeuchteten Wäschlappen geben und sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 30 Sek. Einwirkzeit beachten. Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen/ abdrücken und mit trockenem Handtuch abtrocknen. Stellsept med foam und Stellsept med gloves = "Leave-or"-Produkt. Reinigungsschaum auf den Wäschlappen geben oder mit den getränkten Tüchern sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 60 Sek. Einwirkzeit beachten (Ein Nachwaschen ist nicht erforderlich) Einmalwäschlappen verwenden (außer bei Verwendung von Stellsept med gloves)	<b>Antimikrobielle Ganzkörperwaschung</b>	Patienten/Bewohner entkleiden und Wäsche sofort in den Wäschesack geben <b>Duschen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haare und Körper anfeuchten</li> <li>antiseptische Wäschelotion auf Wäschlappen geben (Dusche abstellen)</li> <li>Rücken (Mithilfe des Personals);</li> <li>Anal-Genitalbereich;</li> <li>Neuen Wäschlappen anfeuchten und mit antiseptischer Seife benetzen;</li> <li>Leiste - Untere Extremitäten;</li> <li>Wäschlappen entsorgen</li> </ul>
Pflegepersonal	Nach Anordnung	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Ggf. Verbandwechsel</b>	Bei trockenen, nicht infizierten Wunden nach der Ganzkörperwaschung
Patient/Bewohner	Nach Pflegeplan	Merialind-Hauptpflegeprodukte		<b>Ggf. Hautpflege</b>	
Pflegepersonal	Täglich	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med <b>Fläche:</b> Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen 30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	<b>Bettwäsche erneuern</b>	Laken, Kopfkissen, Decke usw. abziehen und die kontaminierte Wäsche im Zimmer im Wäschesack entsorgen. Matratze desinfizieren. Vor dem Umgang mit frischer Wäsche Einmalhandschuhe ausziehen, hygienische Händedesinfektion durchführen, neue Einmalhandschuhe anziehen. Bett beziehen.
Pflegepersonal	3 x täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Mupirocin®, ggf. Alternative bei Resistenz <b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	<b>Applikation von Nasensalbe</b>	Streichholzgroße Menge mit einem Wattetupfer in beide Nasenvorhöfe. Nase zusammendrücken, anschließend zwischen Daumen und Zeigefinger massieren.
Reinigungspersonal	Täglich	<b>Fußboden:</b> (Konzentrat) Mikrobac forte, Kohrsolin FF <b>Kleine Flächen:</b> (gebrauchsfertige Tücher) Mikrobac Tissues, Kohrsolin FF Tissues	Mikrobac forte: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. (geringe Belastung) Kohrsolin FF: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. 7,5 ml/l 0,75% - 1 Std. (hohe Belastung)	<b>Desinfektion vom patienten-/bewohnernahen Umfeld und Fußboden</b>	<b>Wischdesinfektion</b> Mobilfahrräder, Kontaktflächen: z.B. Tisch, Nachttisch, Bettgestell, Stuhlflächen, Griffe, Handläufe, Türklinken, Lichtschalter, Telefon, Betttaschen, Klingelanlagen
Pflegepersonal Reinigungspersonal	Vor Verlassen des Patienten-/Bewohnerzimmers	<b>Händedesinfektion:</b> Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	<b>Ausschleusen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einmalhandschuhe ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen</li> <li>Mund-/Nasen-Schutz im Zimmer im Müll entsorgen</li> <li>Einmalschuttkittel ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen</li> <li>Mehrweg-Schuttkittel im Zimmer belassen und bei Diensten im Wäschesack entsorgen; Bei sichtbarer Verschmutzung sofort entsorgen</li> <li>Hygienische Händedesinfektion durchführen</li> </ul>