




MRSA-Hygienemanagement

Pflegestandard mobiler Patient/Bewohner

Das MRSA-Hygienemanagement empfiehlt sich gem. Robert Koch-Institut.

Wer	Wann	Womit	Bitte beachten	Was	Wie
Pflegepersonal Reinigungspersonal Bewohnerzimmers	Vor Betreten des Patienten-/Bewohnerzimmers	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Basishygiene	<ul style="list-style-type: none"> Hygienische Händedesinfektion Mund-/Nasen-Schutz anlegen Schutzmittel anlegen: Foliodress / bei Gefahr der Durchnässung zusätzlich Einmalschutzschürze tragen: Vala Comfort aprons Einmalhandschuhe anziehen: Peha-soft nitrile white, Peha-soft nitrile fino
Pflegepersonal	Nach Anordnung	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Abstriche	Erforderliche Abstriche entnehmen (mind. Nasenvorhöfe, Rachenraum, ggf. Wunden)
Pflegepersonal	Nach Anordnung	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Wunde nach ärztlicher Anordnung abdecken Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Ggf. Verbandwechsel	Bei stark sezernierenden Wunden vor der Ganzkörperwaschung
Pflegepersonal Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten		Auf ausweichend Einmalzahnbürsten achten.	Mundpflege	Zähneputzen mit Einmalzahnbürste
Pflegepersonal Patient/Bewohner	Nach Anordnung	Mundspülösung nach ärztlicher Angabe		Antiseptische Mundspülung/Prothesenpflege	Ärztliche Anordnung für Mundspülung beachten. Zahnprothese in Mundspülösung legen
Pflegepersonal Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten	Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)		Zahnputz-/Prothesenbecher	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch gründlich auswaschen
Pflegepersonal	Täglich	Für sensible Medizinprodukte und empfindliche Oberflächen: Bacillol 30 foam (gebrauchsfertig), Bacillol 30 Tissues (gebrauchsfertige Tücher) Für alkoholbeständige Flächen: Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Pflegehilfsmittel und medizinische Geräte patienten-/bewohnerbezogen verwenden	Desinfektion von persönlichen Gegenständen/Hilfsmitteln Desinfektion von Pflegehilfsmitteln/medizinischen Geräten	<p>Wischdesinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Gegenstände/Hilfsmittel: z.B. Sehlfäden, Hörgeräte, Schmuck, Rasierapparat (Empfehlung: Einmalrasierer verwenden), Fon Pflegehilfsmittel/medizinische Geräte: z.B. Blutdruckgerät, Fieberthermometer
Pflegepersonal	Täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Stellisept med, Stellisept med foam, Stellisept med gloves	Krankenhaus-/Einrichtungswäsche im Waschesack entsorgen. Stellisept med Waschlotion auf den angelegten Waschlappen geben und sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 30 Sek. Einwirkzeit beachten. Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen und mit trockenem Handtuch abtrocknen. Stellisept med foam und Stellisept med gloves = "leave-on"-Produkt. Reinigungsschaum auf den Waschlappen geben oder mit den getränkten Handschuhen sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 60 Sek. Einwirkzeit beachten (Ein Abwaschen ist nicht erforderlich)	Antimikrobielle Ganzkörperwaschung	<p>Patienten/Bewohner entkleiden und Wäsche sofort in den Waschesack geben. Beim Waschen folgende Reihenfolge beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Schritt: Haare; Kopf auf frisches Handtuch legen; Stirn; Gesicht; Bei geschlossenen Augen von außen nach innen waschen; Ohren; Hals; Vorderseite und Seiten; Waschlappen entsorgen 2.Schritt: Oberkörper vorn; Obere Extremitäten; Axillen; Leisten; Oberschenkelaußenseiten; Untere Extremitäten Vorderseite; Genitalbereich; Waschlappen entsorgen; Waschwasser wechseln 3.Schritt: Patienten/Bewohner auf die Seite lagern; frischen Waschlappen benutzen; Hals; Nacken und Seiten; Rücken; Gesäß; Untere Extremitäten; Rückseite; Analbereich; Waschlappen entsorgen; Bewohner/Patienten abtrocknen; ggf. Einmalschutzschürze wechseln <p>Solange der Patient/Bewohner auf der Seite liegt mit dem Wechsel der Bettwäsche beginnen</p> <p>Nach der Ganzkörperwaschung ggf. Verbandwechsel und Hautpflege durchführen und im Anschluss Patient/Bewohner mit frischer Wäsche bekleiden</p>
Pflegepersonal	Täglich	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med Fläche: Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen Der Bettwäschewechsel ist ggf. mit 2 Pflegepersonen durchzuführen, um eine Rekontamination der frischen Wäsche zu vermeiden. 30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Bettwäsche erneuern	<p>Einmalhandschuhe sind vor dem Kontakt mit frischer Wäsche zu wechseln und eine hygienische Händedesinfektion muss erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopfkissen abzelen; Gebrauchtes Steck- und Bettlaken zur Mitte hin-aufrollen; Wischdesinfektion der freien Matratzenhülle; andere Seite legen; Frisches Laken der Länge nach bis zur Mitte aufrollen Gefaltene Matratze desinfizieren; MolliNea textile ausbreiten, bis zur Mitte aufrollen, in Gesäßhöhe legen und ggf. unter der Matratze einschlagen; Patienten/Bewohner über den Waschehugl auf die andere Seite legen; Gebrauchte Wäsche auf der anderen Seite abzelen und im Waschesack entsorgen; Restliche Matratze desinfizieren; Frisches Bettlaken/Stecklaken oder/und Krankennunterlage der Länge nach von der Bettmitte ausrollen, Laken straff ziehen und einspannen; Kopfkissen, Lagerungskissen und Bettdecke beziehen
Pflegepersonal	Nach Anordnung	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Ggf. Verbandwechsel	Bei trockenen, nicht infizierten Wunden nach der Ganzkörperwaschung
Pflegepersonal	Nach Pflegeplan	MenaIind-Körperpflege		Ggf. Hautpflege	
Pflegepersonal	3 x täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Mupirocin®, ggf. Alternative bei Resistenz Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Applikation von Nasensalbe	Streichholzgroße Menge mit einem Wattetupfer in beide Nasenvorhöfe. Nase zusammendrücken, anschließend zwischen Daumen und Zeigefinger massieren.
Pflegepersonal Reinigungspersonal	Täglich	Fußboden: (Konzentrat) Mikrobac forte, Kohlsolin FF Kleine Flächen: (gebrauchsfertige Tücher) Mikrobac Tissues, Kohlsolin FF Tissues	Mikrobac forte: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. Kohlsolin FF: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. (geringe Belastung) 7,5 ml/l 0,75% - 1 Std. (hohe Belastung)	Desinfektion vom Patienten-/bewohnernahen Umfeld und Fußboden	Wischdesinfektion Möbiliar und Kontaktoberflächen: z.B. Tisch, Nachttisch, Bettgestell, Stuhlhähchen, Griffe, Handläufe, Türklinken, Lichtschalter, Telefon, Bettgäulen, Klingelanlagen
Pflegepersonal Reinigungspersonal Bewohnerzimmers	Vor Verlassen des Patienten-/Bewohnerzimmers	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Ausschleusen	<ul style="list-style-type: none"> Einmalhandschuhe ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Mund-/Nasen-Schutz im Zimmer im Müll entsorgen Einmalschutzmittel ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Mehrweg-Schutzmittel im Zimmer belassen und bei Diensten im Waschesack entsorgen; Bei sichtbarer Verschmutzung sofort entsorgen Hygienische Händedesinfektion durchführen



MRSA-Hygienemanagement

Pflegestandard mobiler Patient/Bewohner

Das MRSA-Hygienemanagement empfiehlt sich gem. Robert Koch-Institut.

Wer	Wann	Womit	Bitte beachten	Was	Wie
Pflegepersonal Reinigungspersonal Bewohnerzimmers	Vor Betreten des Patienten-/ Bewohnerzimmers	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Basishygiene	<ul style="list-style-type: none"> Hygienische Händedesinfektion Mund-/Nasen-Schutz anlegen Schuttkittel anlegen: Foliodress / bei Gefahr der Durchmässung zusätzlich Einmalschutzschürze tragen: Vala Comfort aprons Einmalhandschuhe anziehen: Peha-soft nitrile white, Peha-soft nitrile fino
Pflegepersonal	Nach Anordnung	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Abstriche	Erforderliche Abstriche entnehmen (mind. Nasenvorhöfe, Rachraum, ggf. Wunden)
Pflegepersonal	Nach Anordnung	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Wunde nach ärztlicher Anordnung. Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Ggf. Verbandwechsel	Bei stark sezernierenden Wunden vor der Ganzkörperwaschung
Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten		Auf ausreichend Einmalzahnbürsten achten	Mundpflege	Zähneputzen mit Einmalzahnbürste
Pflegepersonal Patient/Bewohner	Nach Anordnung	Mundspülösung nach ärztlicher Angabe		Antiseptische Mundspülung/ Prothesenpflege	Ärztliche Anordnung für Mundspülung beachten. Zahnprothese in Mundspülösung legen
Pflegepersonal Patient/Bewohner	3x täglich bzw. nach den Mahlzeiten	Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)		Zahnputz-/Prothesenbecher	Mit Desinfektionsmittel getränktem Einmal Tuch nach Benutzung gründlich auswischen
Pflegepersonal	Täglich	Für sensible Medizinprodukte und empfindliche Oberflächen: Bacillol 30 foam (gebrauchsfertig), Bacillol 30 Tissues (gebrauchsfertige Tücher) Für alkoholbeständige Flächen: Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Pflegehilfsmittel und medizinische Geräte patienten-/bewohnerbezogen verwenden	Desinfektion von persönlichen Gegenständen/Hilfsmitteln Desinfektion von Pflegehilfsmitteln/medizinischen Geräten	Wischdesinfektion <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Gegenstände/Hilfsmittel: z.B. Sehlfäden, Hörgeräte, Schmuck, Rasierapparat (Empfehlung: Einmalrasierer verwenden), Fön Pflegehilfsmittel/medizinische Geräte: z.B. Blutdruckgerät, Fieberthermometer
Patient/Bewohner	Täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Stellsept med, Stellsept med foam, Stellsept med gloves	Krankenhaus-/Einrichtungswäsche im Wäschesack entsorgen Stellsept med Wäsche in auf den angefeuchteten Wäschesack geben und sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 30 Sek. Einwirkzeit beachten. Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen/ abdrücken und mit trockenem Handtuch abtrocknen. Stellsept med foam und Stellsept med gloves = "Leave-or"-Produkt. Reinigungsschaum auf den Wäschesack geben oder mit den getränkten Tüchern sorgfältig über das jeweilige Körperareal verteilen. 60 Sek. Einwirkzeit beachten (Ein Nachwaschen ist nicht erforderlich) Einmalwäschesappen verwenden (außer bei Verwendung von Stellsept med gloves)	Antimikrobielle Ganzkörperwaschung	Patienten/Bewohner entkleiden und Wäsche sofort in den Wäschesack geben Duschen: <ul style="list-style-type: none"> Haare und Körper anfeuchten antiseptische Wäsche in auf Wäschesack geben (Dusche abstellen) Rücken (Mithilfe des Personals); Nach Einwirkzeit Körper mit Wasser abdrücken. Abtrocknen. Frische Wäsche anziehen (vorher ggf. Verbandwechsel und Hautpflege)
Pflegepersonal	Nach Anordnung	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Ggf. Verbandwechsel	Bei trockenen, nicht infizierten Wunden nach der Ganzkörperwaschung
Patient/Bewohner	Nach Pflegeplan	Merialind-Hauptpflegeprodukte		Ggf. Hautpflege	
Pflegepersonal	Täglich	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med Fläche: Bacillol AF (gebrauchsfertig), Bacillol AF Tissues (gebrauchsfertige Tücher)	Nicht verwendete Bettwäsche im Zimmer belassen 30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Bettwäsche erneuern	Laken, Kopfkissen, Decke usw. abziehen und die kontaminierte Wäsche im Zimmer im Wäschesack entsorgen. Matratze desinfizieren. Vor dem Umgang mit frischer Wäsche Einmalhandschuhe anziehen, hygienische Händedesinfektion durchführen, neue Einmalhandschuhe anziehen. Bett beziehen.
Pflegepersonal	3 x täglich über 5 Tage (nach Anordnung)	Mupirocin®, ggf. Alternative bei Resistenz Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	Einmalhandschuhe anziehen. Nach Entsorgen Durchführung der hygienischen Händedesinfektion (30 Sek. Einwirkzeit beachten)	Applikation von Nasensalbe	Streichholzgroße Menge mit einem Wattetupfer in beide Nasenvorhöfe. Nase zusammendrücken, anschließend zwischen Daumen und Zeigefinger massieren.
Reinigungspersonal	Täglich	Fußboden: (Konzentrat) Mikrobac forte, Kohrsolin FF Kleine Flächen: (gebrauchsfertige Tücher) Mikrobac Tissues, Kohrsolin FF Tissues	Mikrobac forte: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. (geringe Belastung) Kohrsolin FF: 5,0 ml/l 0,5% - 1 Std. 7,5 ml/l 0,75% - 1 Std. (hohe Belastung)	Desinfektion vom patienten-/bewohnernahen Umfeld und Fußboden	Wischdesinfektion <ul style="list-style-type: none"> Möbiliar und Kontaktflächen: z.B. Tisch, Nachttisch, Bettgestell, Stuhlflächen, Griffe, Handläufe, Türklinken, Lichtschalter, Telefon, Betttaschen, Klingelanlagen Einmalhandschuhe ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Mund-/Nasen-Schutz im Zimmer im Müll entsorgen Einmalschutzkittel ausziehen und im Zimmer im Müll entsorgen Mehrweg-Schutzkittel im Zimmer belassen und bei Diensten im Wäschesack entsorgen; Bei sichtbarer Verschmutzung sofort entsorgen Hygienische Händedesinfektion durchführen
Pflegepersonal Reinigungspersonal	Vor Verlassen des Patienten-/Bewohnerzimmers	Händedesinfektion: Sterillium, Sterillium classic pure, Sterillium med	30 Sek. Einwirkzeit hygienische Händedesinfektion	Ausschleusen	